

石室秘錄

石室秘錄卷之二 目錄

卷一 寒集

上治

頭痛 目痛 耳聾 口舌生瘡 鼻噴  
眉落 烏髮 瘰癧 瘰癧 目生星

中治

便治諸

下治

腹癰 疔瘡 瘰癧 瘰癧 瘰癧  
馬毒 乳癰 風 疔 疔 疔 疔

先治

外感初起 內傷初起  
陽寒初起

後治

補正攻邪

急治

風邪作喘 直中陰寒 中心卒痛 中痰 中邪  
中氣 氣痛 非外感 腹痛 非內傷

緩治

陽明之火 大渴 大吐 大瀉

本治

心驚不安 夜臥不寧  
精滑夢遺 見色則洩

未治

大便不通 小便不通  
癰症不已 產婦厥中風邪

不內外治

跌仆斷傷

陰治

腎虛感寒 水虧夜熱

陽治

傷寒發熱 中暑火燒  
傷暑吐血 陽症火瀉

假治

假熱 假寒

真治

真熱 真寒

男治

狐疝 強陽不倒  
痿陽不振

女治

風邪入血室

虛治

氣虛 血虛

實治

治實邪

寒治

吐血衄血 目腫

熱治

口舌生瘡 驚悸吐瀉

通治

心寒胃弱 痢下通治 火瀉通治

寒治

下血通治 氣虛中滿

解治

飽食煩塞 結胸 內傷肝鬱

欬治

亡陽 下血 吐血

升治

頭暈 手汗 陽虛下陷

墮治

陰虛下陷 腹痛三症

開治

開胃 尸厥

閉治

父反脫精 夢遺脫精

吐治

或塊塞

泄治

石室秘錄卷之二 樂集

山陰陳士鏗遠公甫敬者

義烏

金以謀孝芭甫訂定  
李祖詠子永甫彭改

上治法

論頭疼目痛

耳聾

口舌生瘡

鼻腫

冒落

烏蟻

療中

日生星

天師曰上治者治上焦之症也如頭疼目痛耳聾口舌生瘡鼻腫  
之類頭疼而風入太陽經也用川芎一錢細辛一錢白芷一錢柴  
胡一錢芍藥三錢半夏一錢甘草一錢治之蓋風雖犯太陽治法  
不可全治太陽當上清其邪故用白芷川芎細辛三味以散之又  
用白芍甘草柴胡以清肝胆之火胆經與肝經入於頭絡故用此  
數味以散邪去火又加半夏去痰甘草和中相濟而有成也

醫方

洗目

洗目

張公曰頭痛余傳一方用川芎一兩蔓荊子二錢水煎服立愈  
蓋川芎補血蔓荊子去風也

天師曰目痛者肝經之病宜治肝矣而余偏不治肝方用黃連一  
錢花椒七粒明礬三分荊芥五分生薑一片水煎半碗乘熱洗之  
一日洗七次明日即愈此治火眼之如此若虛火之眼又不如是  
用人乳半鍾生地二錢威蕤仁五分去殼取一分研碎明礬半分  
水半鍾同人乳煎藥取汁少許洗七次明日即愈虛火之眼紅而  
不痛不澁無淚無眵是也有火者紅腫如含桃淚出不止酸痛羞  
明多眵是也

雷公曰予亦有治目痛方用柴胡防風各二分黃連三分花椒

三粒明礬一分水半鍾飯鍋蒸洗眼如神一日洗三次二日即止痛

張公曰目痛余亦有一方最妙以人乳一合黃連三分大棗一  
個明礬三分人參三分水半鍾同煎二沸即取起洗眼無論虛  
眼實眼奇妙每日洗七次三日即全愈

天師曰耳聾者腎經病也論理該用六味地黃丸內加柴胡五錢  
華蔞二兩當歸三兩枸杞三兩麥冬三兩北五味三錢白芍二兩  
今不用此鼠胆一枚龍齒一分冰片一分射香一分硃砂一分乳  
香半分朝腦半分各研爲絕細末以人乳爲丸如梧子大外用絲  
綿裹之不可太大塞入耳之深處至不可受而止塞三日取出即



耳聰永不再聾不必三九但鼠胆最難得覓一大鼠先以竹籠養  
之後以紙爲匣子引其藏身內用菓品令其自食久之忽然用棒  
撻擊死立時取胆則胆在肝中也否則再不可得乾者可用只消  
用水調化俱入藥末中則一樣也實耳聾者亦用此方神効○鼻  
腫者乃肺經火盛也宜用甘桔湯則効今不用方用皂角末吹入  
打嚏數十卽愈蓋鼻因氣壅今打嚏則壅塞之氣盡開散故不  
必清肺而鼻腫自消也○口舌生瘡者乃心經熱也宜用黃連黃  
芩之類涼散之自愈今不用用黃柏一錢姜蚕一錢枳殼燒灰五  
分炙甘草末五分薄荷末五分冰片三厘山豆根五分各爲末絕  
細滲上一日滲三次第一日卽少快明日全愈神方也以上皆上

治之法也

天師口眉落方用桑葉七片每日洗之一月重生如舊鬚落亦然  
鬚白當留一方以救天下白鬚老子鬚白乃腎水枯任督血乾也  
二者得一方皆能白鬚地日湯最妙余不用用桑椹半觔取汁一碗  
以骨碎補一兩爲末浸之晒乾無日則用火焙乾再浸以浸乾爲  
度再用何自烏生者爲末二兩用赤不用白熟地焙乾爲末二兩  
青鹽一兩沒石子雌雄各四對長者雄圓者雌當歸一兩各爲細  
末每日擦牙者七七擦左右各如數一月 問卽黑如漆蓋桑椹  
專能補陰黑鬚而又佐之熟地首烏豈有不黑之理但苦不能引  
入頰根耳今妙在用骨碎補沒石直透齒肉之內旣入齒肉有不

桑葉神  
 又方名  
 熟地一觔  
 麥冬一觔  
 片小胡五  
 片太極一  
 重更之  
 八兩山  
 二動海燭  
 皮四兩花  
 椒二兩白  
 果二兩巨

引鬚根者乎此方之所以巧而奇也倘更用烏鬚補腎以通任督  
 則上下相資吾見長生不老未必非此老人况僅僅鬚髯有不重  
 臻於年少之時乎今併傳之桑椹一觔蒸熟晒乾不蒸則此物最  
 不肯乾但不可經鉄器飯鍋蒸則無害大約熟地一經飯鍋雖鉄  
 器無碍生赤何首烏一觔切片飯鍋蒸熟晒乾九次爲妙南燭葉  
 一觔亦飯鍋蒸熟晒乾若不蒸自乾則無用熟地一觔麥冬半觔  
 花椒去殼皮二兩以四兩取米二兩白果一兩白朮一觔此方不  
 刊即名爲陳氏烏鬚丸久服長生不老春夏服地日丸秋冬服此  
 丸保汝升躋有路班白無踪無桑椹時可以桑葉代之須用一觔  
 雖棋勝於葉而葉之功亦不亞椹也

張公曰烏鬚方此方最妙其餘  
 秦真人萬年青方亦當附入  
 〇唇口生瘡可將口瘡方同治  
 華君曰傳余無白頰重烏方然予傳方中尚有喉間瘰癧之方  
 今傳之方用白芍一兩柴胡五錢香附一兩白朮五錢金銀花  
 三兩瓦草一錢瓦礫亦可青苔一錢乾者止可用三分人參五  
 錢白芥子二錢各為末人有病瘰癧者用米醋調搽核核之上  
 如已破者不可用醋調用麻油調之內服方用柴胡五分白芍  
 五錢當歸五錢半夏一錢白芥子三錢甘草一錢桔梗三錢水  
 煎服用前藥外治以此湯內治尤易見功不服此方亦未嘗不  
 愈但遲日耳耳  
 山藥二兩  
 五味二兩  
 陳四兩北  
 三兩三  
 子白果各  
 三兩三  
 何首烏各  
 白朮生赤  
 露各八兩  
 仁山藥各  
 比一物各  
 聚公傳此  
 妙和方也  
 金而巳通  
 五錢重  
 納下各  
 烏丸通  
 湯用各

張公曰烏鬚方此方最妙其餘  
 秦真人萬年青方亦當附入  
 〇唇口生瘡可將口瘡方同治  
 華君曰傳余無白頰重烏方然予傳方中尚有喉間瘰癧之方  
 今傳之方用白芍一兩柴胡五錢香附一兩白朮五錢金銀花  
 三兩瓦草一錢瓦礫亦可青苔一錢乾者止可用三分人參五  
 錢白芥子二錢各為末人有病瘰癧者用米醋調搽核核之上  
 如已破者不可用醋調用麻油調之內服方用柴胡五分白芍  
 五錢當歸五錢半夏一錢白芥子三錢甘草一錢桔梗三錢水  
 煎服用前藥外治以此湯內治尤易見功不服此方亦未嘗不  
 愈但遲日耳耳

烏雞皮四兩 附明琥珀 三兩如朱 片三兩 亦可 九服五錢 一方 公他 可加三兩 加 天 白 財 化 方

天師曰眼目星久不能去止可去暫時者方用白蔹三錢水煎洗之三日即無星尤妙○癩痺乃鼠食之物人不知食之多生此病然亦有鬱氣者乃易成而不愈也方用白芍三兩白芥子三兩紫貝天葵三兩香附三兩茯苓三兩當歸三兩人參五錢蒲公英一兩柴胡五錢白朮五兩砂仁二錢各為末米飯為丸如細米一半大每日白滾水送下三錢日三服一月即消二月全愈○跌損唇皮之類以桑白皮作線縫之以生肌散滲之自合

雷公曰予有烏鬚二方一九方用熟地二觔白朮一觔麥冬一觔山茱萸半觔黑芝麻半觔山藥一觔桑葉一觔巴戟四兩白

果四兩爲末蜜爲丸每日早晚各服五錢萬年青六片加入尤妙一煎方熟地一兩生何首烏赤者一兩桑葉一兩白果三錢黑芝麻五錢炒研碎山藥一兩萬年青半片人參三錢花椒一錢水煎加酒一茶鐘再加桔梗五分早服頭煎晚服二煎夜服二煎四劑卽黑如漆三方同用末不再白倘氣血虛者用服十劑必效

孫真君曰耳聾用珍珠一粒外用龍骨末一分以蜜調之丸在珠上外又用月砂爲衣綿裹塞耳中卽愈神方也一月後取出再用六味地黃丸一料不再聾又白鳥方莫妙用乾桑椹一觔飯鍋蒸熟晒乾生何首烏一觔爲丸三味朝夕吞服自然

烏黑矣蓋一味原是烏鬚之聖藥能日日服之延生返老豈特  
鬚髮之黑哉或少加白菓尤妙不必加熟地藥愈多其功轉不  
大欲用生何首烏者以滋味不外泄也連皮用之正取其皮引  
入人之皮毛耳每日服五錢或一兩俱可無權用桑葉二觔首  
烏一觔可也

妙極

外科聖藥  
卷之四

# 中治法

論統治諸瘡

天師曰中治者或胸前生瘡乳上生瘡兩脇兩背兩手生瘡是也然而瘡瘍別有專門此不必再贅既已立門存一治法統治中焦部位之瘡無不神效方用金銀花一兩元參一兩生甘草五錢白礬二錢有病則病受之也當歸一兩白芍一兩炒梔子三錢荆芥三錢連翹二錢白芥子二錢水煎服一服知二劑全消破潰者四劑愈如陰瘡方中去梔子加肉桂一錢此方統治中焦諸瘡俱效妙在用散邪敗毒之品於補藥之內轉足以消毒而去火也此中治之法

張公曰岐真人統治瘡瘍之方妙甚然余更有奇方用生甘



草一兩當歸一兩蒲公英一兩黃芩一錢金銀花二兩乳香一錢爲末先將前藥用水五碗煎一碗將乳香末調飲之神效亦足附前方之功也一身上下俱可治之乃統治之法

華君曰予同傳無可語

孫真君曰予亦有一方統治諸瘡方用天花粉三錢生甘草一兩金銀花一兩蒲公英五錢水煎服一劑輕二劑全愈此方消毒實有奇功下治諸癰可統治之也

卜治法

論腿癰

多骨癰

囊癰

騎馬癰

鶴膝風

腳脛爛瘡

天師曰下治者乃生腿癰多骨癰囊癰騎馬癰鶴膝風兩腳爛瘡  
脚疽等項是也。要癰騎馬癰最難治。此皆少年人不保重或串花  
街柳巷或貪倚翠偎紅忍精而戰耐饑而守或將洩而提其氣或  
已走而再返其陽或人方洩精而我又入其戶皆足以生此惡毒  
也。方用金錢花四兩蒲公英二兩人參一兩當歸一兩生甘草一  
兩大黃五錢天花粉二錢水煎服一劑即消二劑全愈潰者三劑  
愈。蓋此毒乃乘虛而入必大補其血而佐以逐邪之品則病去如  
失。否則旋轉流連禍不旋踵與其毒勢彌漫到後來發散何不乘  
其初起正氣未衰一劑而大加祛逐之爲快哉。方中妙在金銀花

而以當歸補血爲君人參爲佐大黃爲使重輕多寡之得宜也○  
鶴膝風治法則又不然此又因濕而戰立而行房米氣襲之故成  
此疾方用黃芪八兩肉桂三錢薏仁四兩茯苓二兩白朮二兩防  
風五錢水十餘碗煎二碗分作二服上午一服臨睡一服服後以  
厚被蓋之必出大汗不可輟去其被令其汗自乾則愈一服可也  
不必再服此方妙在用黃芪以補氣蓋兩足之所以能動而舉步  
者氣以行之也今鶴膝之病則人之氣虛不能週到行步自然艱  
難今用黃芪半斤則氣旺極矣又佐之肉桂以通其氣又佐之防  
風以散其邪始相惡而相濟又佐之白朮薏仁以去其寒濕之氣  
邪氣去則正氣自固此功之所以速成也若以爲人不能受畏而

北齊書

秘傳

不用則反害之矣。多骨疽乃生於大腿之中多生一骨者是乃濕熱而生者也。治之得法則易易耳。否則變生可畏。方用當歸一兩金銀花一兩白芍一兩柴胡一錢茵陳三錢龍胆草三錢白朮三錢生甘草三錢水煎服。即愈。苟或失治。即長一骨橫插於皮間。作痛必須取出。此骨始愈。以鉄鉗鉗出之外。用前生肌方藥膏貼之。兩個即愈。此方妙在用白芍。蓋白芍能平肝木。又能活筋。多骨疽者非骨也。筋變為骨。似骨而非骨也。白芍不特平肝木之火。兼能散肝木之邪。邪去則筋舒。筋舒則似骨非骨者盡化。又加金銀花原能去毒。此二味之所以相濟也。○足疽亦濕熱也。方用金銀花一兩蒲公英一兩生甘草三錢當歸二兩薏仁二兩水煎服。二

刺即愈。蓋此方妙在用薏仁爲君。蓋濕氣必下受而水流必下行。薏仁去濕而利關節之氣。金銀花去火毒之邪。助之以生甘艸則邪易散而濕易退矣。然而血虛則水氣易侵。濕邪易入。今用當歸以補其血。血足水無所侵而濕難以入。故用之合宜而病可速效也。○腳脛之生爛瘡亦濕熱也。往往兩腿腐爛臭氣難聞。若止以湯藥治之未易奏效。先以煎湯溫洗。後以白蠟一兩黃丹二兩韭菜地上蚯蚓糞二兩炒乾一兩五錢米片五分朝腦三錢射香五分血竭五錢鉛粉一兩炒松香三錢乳香去油三錢沒藥三錢銅綠三分輕粉一錢兒茶三錢各爲絕細末。乘熱湯洗濕之時。滲在瘡口之上。必然癢不可當。但不可用手抓。其癢少頃必流黃水。如

金汁者數碗再用葱湯洗之又滲又流又滲如是者三次則水漸少而痛漸止矣明日用前膏藥以厚皮攤背仍入此末藥加入二錢貼之任其水出倘瘰之極外以鶴翎掃之卽不癢貼二膏卽止水而愈腿癰卽照多骨治法不再立方脚脰爛瘡內服湯藥金銀花一兩薏仁二兩茯苓一兩生甘草五錢牛膝五錢葦葉五錢牛夏五錢肉桂五分水煎服自貼膏藥連用此方二劑卽愈此方妙在薏仁爲君金銀花草薢爲臣茯苓爲佐使薤白去兩足之濕茯苓能分消脾胃中之濕氣生甘草金銀花能解鬱熱之毒而草薢又善走足且能去濕健腰又加之牛膝以助其筋力則爛濕之瘡有不去之如失者乎此下治之最妙者也

癰疽

張公曰下治法盡於此矣余欲尚贊高深多骨之生也雖生於  
濕熱而成之不由濕熱也必有人喜飲凉水好食菓品而成之  
初生多骨疽之時即用大黃一兩芙蓉葉晒乾爲末一兩射香  
三分米片三分五煨子一兩臘黃三錢生礬三錢各爲末米醋  
調成如厚糊一樣塗於多骨疽之左右四週以藥圍其皮肉中  
留一頭如豆大以醋用鵝翎不時掃之若不掃任其乾則無  
益也一日夜卽內消疽生於環跳之間不用此圍藥多成多骨疽  
故疽一生無論其有骨無骨卽以此藥敷之神效其餘癰疽疔  
毒亦以此藥敷之無不神效

華君曰予無可論

天師云方  
神效之甚  
勝方也

雷公曰我亦有治多骨之方用內消之法最奇效大凡毒至於  
環跳之穴者即多骨疽也用 人參三錢大黃五錢蒲公英一兩  
金銀花二兩天花粉三錢薏仁三兩先用水六碗煎薏仁取湯  
三碗煎前藥三碗分作二次服二日服兩劑即消神方也若已  
潰用天師方法治之

鶴膝風古多用大防  
此除去血藥想用其



醫方

未有不效

豈可輕用

胡不須高

則

先治法

論外感初起

論內傷初起

論傷寒初起

大師曰先治者宜先而先之也。人病發熱必先散其邪氣。俟邪氣速去而後再扶其正氣。則正氣不為邪所傷。方用柴胡一錢、荆芥一錢、半夏一錢、黃芩一錢、甘草一錢。小煎服。則邪散而身涼。蓋四時不正之氣來犯人身。必然由皮毛而入營衛。今用柴胡、荆芥先散其皮毛之邪。邪既先散。安得入裏。方中又有半夏以祛痰。使邪不得挾痰以作祟。又有黃芩以不得挾火以作殃。况又有甘草調和藥味。以和中邪。既先散而正氣又不相銷。此先治之妙也。一方亦可類推。

張公曰先治法最妙。無奈世人不肯先服藥。何所以邪由皮毛

內傷第  
外感第

才學

卷之二

第

而入營衛由營衛而入臟腑也。倘先用此方，又何至傳經深入哉？先治法甚多，不能盡再傳三方，觸類旁通，無非先治之法。一方用柴胡一錢，當歸一錢，白芍二錢，甘草、陳皮各一錢，天花粉二錢，梔子一錢。水煎服此方，凡肝脈鬱者，用一劑即快，不必專是外感也。治內傷初起者，神效。又一方用柴胡一錢，白芍一錢，茯苓一錢，甘草一錢，當歸二錢，麻黃一錢，桂枝一錢，陳皮五分。水煎服此方，專治傷寒初起者，神效。乘其尚未傳經，可從補正之中，兼用祛邪之品而熱散之也。蓋初起之邪，尚不敢與正氣相敵，故一補正氣而邪氣自消。及一傳經，則正氣遁入於臟腑，不敢與邪相爭，愈補而愈不敢出也。故一傳經，則萬萬不可用。

補藥今乘其初起之時亟用補劑而加之祛邪之品用桂枝以熱散用麻黃以祛寒寒熱相攻邪難內入而又有正氣之健助所以一劑而盡愈也先治之法二方最妙幸留意而善川之華君曰予未聞師傳也

雷公曰天下最難治者莫過傷寒然得其法治之又甚易張仲景論之詳矣今又增一法以治傷寒初起之病攻補兼施寔有卓見惜世人未知其論耳其方可試無不神效然而人見白朮當歸之多用疑于太補不知傷寒初起何畏于補耶意尚可加入人參一錢乘其邪未深八補正以逐邪則邪易走也又何疑于未歸之用哉

治外感初起用小柴胡

八參姜棗加荊芥按小柴胡原治傷

風成熱故用之

亦非外感

須知內有濕熱之人

而兼外感者用之則宜

察脈左右兩寸關俱弦洪者爲準

李于

永鑑

後治法 論補正攻邪

天師曰後治法者宜後而後之也人有正氣虛寒以中邪氣風寒不可先攻其邪蓋邪之所湊其氣必虛邪之敢入於正氣之中者是人正氣先虛也不急補其正氣則邪何所畏而肯速去哉譬如賊人入室主懦而僕從又怯賊必將安坐門庭逍遙酒食矣苟能用二二果敢之士出死力而爭敵則盜寇且急走而不遑也故必先補其正而後可以散邪方用人參三錢黃芪三錢柴胡二錢半夏一錢甘草一錢當歸三錢陳皮一錢白朮三錢神麴五分黃芩五分山查五粒水煎服此方妙在用參歸芪朮以扶正氣加柴胡半夏以祛邪加陳皮山查以消食加甘草以和中不治邪而邪

自退此後治之妙法也

張公曰後治法甚多再傳二法一方用人參一錢白朮三錢甘草一錢半夏一錢柴胡三錢茯苓三錢水煎服此方專治正氣虛而邪入之者如頭疼發熱凡脉右寸口大於左寸口者急用此方無不全愈蓋雖有外邪不可純作邪治當以補正爲先治邪爲後又一方用當歸三錢白芍三錢枳殼一錢檳榔一錢甘草一錢水煎服此方治痢疾之病最效以補正爲先蕩邪爲後其餘後治之法可意會而默思之也

華君曰予未傳

雷公曰後治法有瘧疾方用人參五錢白朮一兩青皮一錢柴

天經云  
命

胡一錢半夏三錢水煎服瘧蟲雖有痰邪不可先治邪此方一  
味補正男爲在邪以消痰然正足而邪自退矣更有陰虛而發  
熱如瘧者亦以前方加熟地一兩生何首烏一兩去半夏換白  
芥子三錢治之亦效

小兒龍症

一

# 急治法

論風邪作喘 直中陰寒中心卒痛中痰中邪中氣 論氣喘非外感 論腹痛非內傷

天師曰急治者不可須臾緩也乃外感之喘脹氣不能息之類如直中陰寒手足厥冷小腹冷痛而欲死者是也如心中卒痛手不可按氣悶欲死者是也凡人忽感風邪寒入乎肺經以致一時一時喘急甚有大喘氣逆痰吐不出人不能臥是也方用柴胡一錢茯苓二錢當歸一錢黃芩一錢麥冬二錢射干一錢桔梗二錢甘草半錢各一錢水煎服此方妙在用柴胡射干桔梗以舒發肺金之氣用半夏以祛痰用黃芩以去火蓋外感寒邪則內必變為熱症今用黃芩以清解之然徒用黃芩雖曰清火轉足以抑遏其火氣妙在用桔梗射干柴胡一派辛散之品轉足以消火滅邪此急



治之一法也。○直中陰寒之症，乃寒邪直入於腎經，不由皮毛而入營衛，不由營衛而入臟腑也。乃陰寒之邪，直中於兩腎之中，而命門之火無可藏之地，乃奔越星散，而寒邪乘其真火逃亡趨勢，趕逐於是入腹則腹痛，入肝則肝絕，入心則人亡。此至急之時，不可用藥之須臾緩也。方用人參五錢，白朮一兩，附子一錢，肉桂一錢，乾姜五分水煎服。此方妙用，人參白朮蓋寒邪直入，宜止用附桂以逐之，何必用參朮而且多加之也。不知寒邪直犯腎宮，元陽遁出於脾胃之間，止此一線之微氣在焉。若不用人參以救之，何能挽回於無何有之處？不多加白朮，何能利其腰膝而回其元氣？故又加附子肉桂以祛散其寒邪也。○中心卒痛，手不可按者，乃

鴻火定

火邪犯心也。若不急救，息其火則藏府內焚，必致身殉。方用梔子三錢、白芍五錢、甘草一錢、良姜三分、天花粉二錢、蒼朮一錢、貫仲一錢。水煎服此方，妙在用梔子以清火，或疑心經之熱宜用黃連以涼之，何以不用黃連而反用梔子耶？蓋心中火發，用黃連固宜，然黃連性燥，心火正在燥烈之時，以燥投燥，正其所惡，不特不能去火，而轉助其焰矣。不若梔子為其肝木之邪母，衰則子亦衰，不瀉心火，正所以瀉心火也。且梔子能瀉六經之鬱火，原不專入肝經，亦能入心經也。一味而兩用之，此用藥之奇妙。况又與白芍共用以瀉肝，又加良姜數分以引入於心中，復增天花粉以逐其火熱之痰，則痰去自然火散，而鬱氣益舒，此急治肝而正急治心也。

又是急治之二法餘可類思

張公曰急治之法妙矣而余更有法如人中痰中邪中氣三法亦不可不講中痰方用人參三錢白朮三錢茯苓三錢附子一錢天南星一錢半夏二錢水煎服下喉卽愈蓋痰之生也由於氣之虛而氣之虛也由於藏府之冷故方中用參朮以補正氣用半夏南星茯苓以祛痰用附子以溫中所以一下喉而痰聲靜痰氣清也中邪方用人參三錢白朮三錢半夏三錢皂角末一錢陳皮一錢水煎服此方之妙在皂角能開人之孔竅引人參白朮半夏之類直入心經而痰之迷滯無不盡開痰去邪將何留中氣方用人參二兩白朮五錢茯苓五錢甘草一錢陳皮

一錢附子一錢半夏三錢南星三錢水煎服此方與中痰方相彷彿而此方勝於前者以分兩之多而又多甘草陳皮以和中  
和內也三法有利於醫者不淺

華君曰予聞之 天師矣尙有二症一則氣喘之不能臥而非  
外感也一則腹痛之不可忍而非內傷也凡人有氣喘不得臥  
吐痰如湧泉者舌不燥而喘不甚一臥則喘加此非外感之風  
邪乃腎中之寒氣也蓋腎中無火則水無所養乃上泛而爲痰  
將胃中之水盡助其涵湧之勢而不可止遏矣法當用六味丸  
湯加附子肉桂大劑飲之則腎官火熱而水有歸歸水既歸宮  
喘逆之氣亦下安而可臥凡人之臥必得腎氣與肺氣相交而

後河車之路平安無奔逆也。方中補其腎火何以安然能臥不知腎爲肺之子子安則母亦寧肺金之氣可歸於腎官以養其耗散之氣矣。此所以補腎火正所以養肺金也。况六味丸全是補腎水之神劑乎。水火同補而肺金更安肺腎相安有不臥之而其適者乎。○凡人腹中疼痛欲死手按之轉甚者此乃火挾痰與食而作祟也。若作直中治之立死矣。方用甘草一錢茯苓三錢白芍五錢枳實一錢梔子三錢山查二十粒水煎服加柴胡一錢此方有解紛之妙乃天師未傳者想於別門見之也。岐天師曰實未傳孫真君有治心痛方管仲三錢乳香末二錢白芍三錢炒梔子三錢甘草五分水煎服一劑卽止痛此方專

治火痛也治呼號口渴者神效

緩治法

論陽明之火火湯  
論大吐 論大瀉

天師曰緩治者不可急而姑緩之也如人病火盛之症大渴引飲  
呼水日救朝食即餓或夜食不止或久虛之人氣息奄奄不能飲  
食者是前症陽明火盛故能食善消自宜竹葉石膏以治之矣然  
而不可急也蓋火盛必然水衰火之有餘水之不足石膏辛散之  
味雖然去火而勢過猛烈實能錄盡真陰大熱之際不得已而用  
之所以救存腎中之水也若日日用之則水不能救而反耗真陰  
之氣真陰之氣既耗則火仍復沸騰不若緩治之為得也方用元  
參一兩麥冬五錢白芥子二錢竹葉三十片乾菊花二錢生地三  
錢陳皮五分丹皮二錢治之此方之妙全在元參能去浮遊之火

使陽明之餘火漸漸消散。冬消肺中之熱。斷胃之來路。用生地清腎中之火。斷胃之去路。加丹皮截胃之旁路。竹葉與白芥子清痰行心火。截胃之中路。四而八方俱是。分散其勢。則餘火安能重聚。此緩治法。勝於急進之功也。至於久虛之人。氣息奄奄。無不曰宜急治矣。不知氣血大虛。驟加大補之劑。力量雖任。必至胃口轉加膨脹。反不若緩緩清補之也。方用茯苓一錢。白朮五分。山藥一錢。陳皮三分。甘草三分。人參三分。當歸一錢。白芍二錢。聚仁五分。山查三粒。麥芽三分。炮姜三分。水煎服。此方妙在用白芍爲君。引參苓入肝。爲佐。小小使令徐徐奏功。潛移默化。使脾氣漸漸胃口漸開。不急於張皇。而徐能奏功。此又緩治之一法。



張公曰緩治之法不止陽明之火宜然 大師借而說法余又  
廣之可也凡人久病俱不可急遽川藥須緩治爲妙譬如人大  
渴之後不可純用止渴之藥是矣然而大吐之人奈何豈亦可  
止嘔之味耶不可也法當用人參五錢茯苓三錢白朮三錢甘  
草三分陳皮一錢豆蔻仁三粒水煎服此方純用健胃補脾之  
劑而人不知其中奧妙也大吐之後津液已乾如何又用健脾  
補胃以重燥之得毋傷子太甚耶不知脾胃之氣健而後津液  
能生苟以潤藥補之則脾胃惡濕反足傷其真氣所以不用潤  
劑而反用燥藥也他藏府惡燥惟脾胃藏府反惡濕而喜燥以  
人參白朮投之正投其所好又安有燥烈之虞哉○大瀉之後

金匱要略

卷之十一

補陰丸

卷之十一

三

藏板

白多亡陰宜以補陰藥治之矣。然而以補陰之藥急治反足增其水勢。法當以溫藥補之用。熟地五兩。山藥四兩。山茱萸四兩。白朮五兩。肉桂一兩。肉苁蓉一兩。北五味一兩。吳茱萸一兩。人參五兩。薏仁五兩。各爲末。蜜爲丸。如大梧子大。每日晚飯前吞五錢。旬日卽健矣。此方之妙。不用茯苓澤瀉猪苓之類。去分消水氣。而水氣自然分消。蓋補腎正所以補脾。而緩治勝於急治也。華君曰。未傳。

本治法

論心驚不安 夜臥不睡  
論精滑夢遺 見色創戈

天師曰本治者治心腎之法也人非心不能寧靜致遠非腎不能作強生育故補心即當補腎補腎即當補心也是二經一身之主宰藏府之根本也故人病心驚不安或夜臥不睡者人以爲心病也誰知非心病也腎病也如人見色而思戰入門而倒戈者或夢遺精滑者人以爲腎之病也誰知非腎病也心病也然則欲安心者當治腎欲治腎者當治心治心方用人參三兩茯苓三兩茯神三兩遠志二兩牛棗仁一兩熟地三兩山茱萸三兩當歸二兩菖蒲三錢黃連五錢肉桂五錢白芥子一兩麥冬三兩砂仁五錢各爲末蜜爲丸每日送下五錢或酒或湯俱可此方乃治心之驚

與不寐耳宜用參冬當歸麥冬足矣卽或爲火起不寐加黃連亦足矣何以反用熟地山茱萸補腎之藥又加肉桂以助火不知人之驚恐者乃腎氣不入於心也不寐者乃心氣不歸於腎也今用熟地山茱萸以補腎則腎氣有根自然上通於心矣肉桂以補命門之火則腎氣既溫相火有權則心氣下行君火相得自然上下同心君臣合德矣○治腎方者精滑夢遺與見色倒戈則關門不守腎無開合之權矣誰知皆心君之虛而相火奪權以致如此方用熟地半觔山藥四兩山茱萸四兩茯苓三兩肉桂一兩附子一兩人參三兩白朮四兩北五味一兩麥冬三兩遠志一兩炒棗仁一兩鹿茸一副巴戟天三兩肉苁蓉三兩柏子仁一兩砂仁五錢

紫何車一副杜仲一兩破故紙一兩各爲末蜜爲丸此方用熟地  
山萸杜仲山藥之類補腎也巴戟天菴容附子鹿茸補腎中之火  
也可以已矣而必加入參苓柏子仁麥冬遠志棗仁之類者何也  
蓋腎中之火虛由於心中之火先虛也故欲補腎火者先補心火  
使心火不補腎火終不能益而轉增其上焦之枯渴故必須兼補  
其心心氣下舒於腎中腎氣上交於心則水火相濟君臣和悅人  
民稟安肺氣清寧脾胃得養通調三焦不妨整戈矛再利卽野禦  
亦可收功也

張公曰予有一言願贊高深本治貴之心腎又何疑焉然而心  
不可徒補之腎而腎不可徒補之心也譬如人有心驚不寐雖

雪公曰天  
師方圓妙  
而後爲  
亦

是腎氣之上不通於心而亦有肝氣之上不生於心故補腎之  
中自宜添入補肝之品方中有當歸肉桂亦是補肝之品然終  
非直入肝經之藥也愚意前方中加入白芍三兩補腎而兼補  
肝相因而生心火心有不泰然者乎腎虛而用補心之藥固是  
然補心而不補肝則肝木鬱塞心難下生惡意補腎方中亦宜  
添入白芍三兩則肝氣自舒自生心包之火火足自生命門之  
火矣可質之岐天師再定去留

華君曰予亦曾聞之 夫子矣有方亦妙并傳於此凡人卧不  
安枕方用人參五兩遠志二兩聚仁炒二兩熟地八兩山茱萸  
四兩茯神三兩栢子仁一兩冬三兩陳皮五錢各爲末

丸每日白滾水送下一兩五日即安一料全愈名爲寧神安眠  
丸人有夢遺者用熟地一觔山藥一觔芡實一觔生棗仁五兩  
巴戟天二兩麥冬三兩北五味三兩蓮子半觔同心川各爲末  
蜜爲丸每日白滾水送下一兩名爲益心止遺丸前方補心中  
而兼補腎後方補腎中而兼補心與 天師傳方全意二方亦  
天師傳也不知何故各各不同然而四方俱奇妙通元甚矣  
夫子之不可測也巴戟天不特強陽而且止精腎水非火不能  
生亦非火不能止若用肉桂附子大熱之味果然助其虛火巴  
戟性非大熱不能溫中用之純陰之中何害反得其既濟之功  
也

夫此方  
乃之妙  
用生藥  
至一兩

又云此方  
不可雜得  
存之可也

孫真君傳治心驚不安方心驚非心病也乃肝血虛而不能養  
心也方用白芍五錢當歸五錢熟地五錢生棗仁一兩遠志一  
錢茯神三錢麥冬五錢北五味一錢人參二錢水煎服此方之  
妙全不盡去治心治肝正所以治心治肺亦所以益心也○又  
傳治見色倒戈方用人參三兩熟地八兩黃芪五兩白朮八兩  
肉桂二兩山茱萸三兩巴戟天五兩肉蓯蓉三兩麥冬五兩北  
五味一兩覆盆子五兩各爲末蜜爲丸每日半飢酒送下一兩  
一月後房事即收觀但不可傳與匪人耳



末治法

論大便不通 小便不通 瘧症不已  
產婦感中風邪

天師曰末治者乃六府之治也人如病大小使不通或瘧症不已  
產後風寒皆作末治也凡久病之後或大便一月不通不必性急  
止補其真陰使精足以生血血足以潤腸大便自出不可視為根  
本之病而速求其愈亦有人小便點滴不出亦不必十分大急乃  
腎氣不能行於膀胱也補其腎氣則小便自出不必視為根本之  
病而急欲出之也大便不通方用熟地一兩元參一兩當歸一兩  
川芎五錢火麻仁一錢蜜半既大黃一錢桃仁十箇紅花三分水  
煎服此方妙在用飢地元參當歸以生陰血少加麻仁大黃以潤  
腸下行此正末治其閉結而不亟亟以通之也小便不通方用約

偶有之  
可為典

桂一錢熟地一兩山茱萸四錢茯苓二錢車前子一錢澤瀉一錢  
升皮一錢山藥一錢水煎服此方即七味地黃湯妙在不去通小  
便而能治腎水腎火蓋腎中有火而膀胱之氣化自行不通小便  
而小便自通矣此未治之一法也○癰症不已終歲連朝經年累  
月或已止而又發或未止而難痊人皆謂有邪未散也急宜逐邪  
不可未視之殊不知邪之久踞乃正虛之甚也自當重補其正而  
未治其邪方用熟地五錢何首烏五錢鱉甲五錢白朮五錢當歸  
五錢人參三錢甘草一錢柴胡一錢半夏一錢肉桂五分山茱萸  
四錢水煎服此方妙在熟地山茱萸當歸之品以補陰血加人參  
白朮以健脾加鱉甲以入陰分加何首烏以補陰氣加半夏柴胡

少少去其痰與邪則正氣有餘邪自退舍此又末治之一法○產婦感中風邪皆作末治者產婦舊血盡去新血未生大虛軀殼原易中邪風寒襲之一散邪必有厥逆寒症之變死亾頃刻矣方用當歸一兩川芎五錢人參一兩荆芥一錢肉桂一錢益母草一錢治之此方妙在川參歸各一兩參已固氣歸以生血氣血既生而風邪易去大虛之人若帶祛邪之藥則邪原易出乃勝○跌打門不鎖故耳方中荆芥一品最妙不特易於祛邪而且引舊血以歸經佐新血以復正故兩用之而成功也益母草更是產科最利之品安有他虞哉此又固氣血爲先散邪爲末又一法也

張公曰俱講得入神出化予又何佐何滾哉尚有一言相商產

去歲不壯  
方內加熟  
地二兩

婦臨月之前一月如有風邪感冒等症皆作風寒感冒治之其  
臨月之期如有感中風邪不可作風邪治之方用人參一兩當  
歸一兩川芎五錢柴胡二錢甘草一錢白芥子三錢水煎服毋  
論其頭疼身痛咳嗽太陽痛六經傳經傷寒俱宜以此方治之  
切不可輕用桂枝麻黃蓋孕婦實與平常人治法大不相同耳  
孫真君曰大便不通亦多實症天師傳者治虛症之方耳我傳  
此方治實症者實有奇效方用大黃五錢當歸尾一兩升麻五  
分蜜半碗水煎服大黃泄利用當歸潤之仍以爲君雖泄而不  
十分過猛不至有亡陰之弊况有升麻以提之則泄中有留又  
何必過慮哉

不內外治法

論跌仆斷傷


天師曰內者胸腹之中外者風邪之犯今既無胸腹之病又無風寒之侵忽然跌仆爲災斷傷受困此不內外之因又一門也方用當歸五錢大黃二錢生地三錢赤芍藥三錢桃仁一錢紅花一錢丹皮一錢敗龜板一錢水一碗酒一碗煎服方中最妙當歸芍藥和其血大黃桃仁逐其瘀生地紅花動其滯一劑即可病去也倘以大黃爲可畏或不用改爲別味則雖有前藥亦用之而不當蓋有病則病受之用大黃之藥始能消去其瘀血而終不能大下其脾中之物又何必過忌哉倘跌傷打傷手足斷折惡以杉板夾住手足不可顧病人之痛急爲之扶正湊合安當倘苟不正此生必

爲廢人故必細心湊合端正而後以杉板夾之再用補骨之藥令其吞服則完好如初矣方用羊躑躅三錢炒黃大黃三錢當歸三錢芍藥三錢丹皮二錢生地五錢土狗十个槌碎土虱三十个搗爛紅花三錢自然銅末先將前藥酒煎然後入自然銅末調服一錢連湯吞之一夜生合神奇之甚不同世上折傷方也不必再服止服二煎可也蓋羊躑躅最能入心而去其敗血人受傷至折傷手足未有不惡血奔心者得躑躅入心引諸活血之藥同群共入則惡血必從下行而新生之血必群入於折傷之處况大黃不特去瘀血亦能逐瘀而生新瘀去而各活血之品必能補缺以遮其門路况土狗土虱俱是接骨之聖藥卽有缺而不全又得自然銅

竟走空缺而補之此所以奏功之速耳骨斷之處自服藥後瑟瑟有聲蓋兩相連貫彼此合縫若有神輸鬼運之巧恐世人不信耳吾傳至此不畏上洩天機者正副遠公好善之心共爲救濟之事庶天眷可邀愆尤可免耳○跌損唇皮之類以桑白皮作線縫之後以生肌散糝之自合

張公曰方至此神矣聖矣化矣亦何能贊一言哉惟有前方煎藥之內少爲商酌者第一方中再加生地三錢枳殼五錢蓋生地乃折傷之聖藥多多益善少則力不全耳折傷之病未免瘀血奔心有枳殼之利於中則瘀血不能犯也

華君曰無可言





陰治法

論腎虛感寒  
水虧夜熱

天師曰陰治者病症乃陰氣不足而陰邪又犯之也如腎水虛寒  
又感寒者或腎水虧竭夜熱晝寒是也此等病若認作陽症治之  
則口渴而發益熾必致劑盡陰水吐痰如絮咳嗽不已聲啞聲嘶  
變成癆瘵法當峻補其陰則陰水足而火焰自消骨髓清泰上熱  
餘火俱歸烏有矣方用熟地一兩山茱萸五錢麥冬五錢北五味  
五錢元參三錢地骨皮三錢丹皮一錢沙參五錢白芥子一錢芡  
寔五錢車前子一錢桑葉七片水煎服此方妙在全用純陰之品  
一直竟進腎宮滋其匱乏則焦急之形不上焰於口舌皮毛之際  
又加元參地骨皮沙參丹皮之品少清其骨髓中之內熱自然陰

寒  
寒  
寒

寒  
寒  
寒

長陽消不治陽而自安也。又何必更加柴胡以散之而邪始去哉。此方乃治陰火自動者。神效。若陰寒無火者。又不宜用。此方當用肉桂一錢。附子一錢。熟地一兩。山茱萸四錢。白朮三錢。人參三錢。柴胡五分。水煎服。此方之妙。用附桂祛寒之藥。加之於參熟補陰之內。使陽得陰而有制。不至奔越沸騰。少加柴胡。數分則陰邪自散。又何必純用麻黃桂枝之類。鏖盡真陰哉。況腎中之火。必得水而後生。以水非邪水。乃真水也。邪水可以犯心而立死。真水可以救心而長延。蓋陽根於陰。而真陰腎水寔爲真陽君相之火之母也。此方中加熱地山茱。正是此意。恐人未知。故又表而出之。倘止用附桂以祛寒。水膏不救。然而邪去而陰消。必然枯渴。苟或治之。

藏板

不得法必有亡陽之症矣。顧人加意於水中補火，更於水中去邪也。

張公曰：妙絕之論，發千古所未發，何以再贊高深。然尚有一方以參之前症，乃陰虛火動也。用六味湯似亦相宜。後症乃陰寒無火也。八味湯似亦可用。然而終不及。天師二方，蓋治陰之內，卽留以治陽而治陽之中，卽藏於補陰也。有貧不能用，人參者，用子後方可也。

華君曰：同傳子法無異。

世濟

陽治法

論陽寒發熱 中暑火熾  
陽暑吐血 陽症火瀉

天師曰陽治者治陽症之病也陽症甚多不能概舉姑舉一二症  
大者言之傷寒內發斑身熱心如火口渴呼水氣喘舌燥揚手出  
身者是或中暑熱之氣大渴飲水數桶不止汗如雨下大喊狂呼  
日重夜輕是也此皆陽火燒焚於胃口烟騰勢急威猛不可止遏  
皆陽症也此時杯水實不足以勝之非大劑寒涼安能扑滅卽以  
用寒涼扑滅之矣而餘烟斷火微焰猶存必得大雨滂沱屋棟溝  
渠無非膏澤則火氣消亡門庭可整此陽症之治難于陰症也方  
用元參三兩升麻二錢黃芩一兩麥冬三兩防風三錢天花粉三  
錢蘇葉一錢青黛三錢生甘草三錢生地一兩桑白皮五錢一劑

卽消大半二劑全愈此方妙在元參爲君不特去其浮遊之火兼能清其胃中之熱且性又滋潤發斑雖是火熱不能外越然亦因胸中水少不足潤故鬱而不出也今用元參潤之則火得潤而難居况又有黃芩以大涼其胸膈又加升麻防風引散其火邪更佐之麥冬生地涼血以清肺氣自然清肅下行而中焦之火盡化爲烏有也○至於中暑之病亦陽火邪熾也法用青蒿五錢石膏五錢麥冬五錢半夏一錢黃連一錢人參三錢甘草一錢茯苓五錢竹葉五十片水煎服此方妙在用青蒿去暑再加二錢香薷則暑氣自化用石膏以平瀉其胃中之邪火邪火一去胃氣始轉水能下行不蓄停於膀胱之內而散逸於四肢况又有茯苓導其下行

者乎又慮火氣傷心復加黃連以救心人參以救肺各藏既安胃邪必遜此治陽症之妙法也

張公曰妙論出奇不窮陽症固多二症最急故 天師特舉之以爲法予再廣之有二症在焉一則傷暑中之吐血也凡人感傷暑氣忽然吐血傾盆人皆謂是陰虛不知陰虛吐血與陽虛吐血不同陰虛吐血者人必安靜不似陽虛之燥動寧寧也陽虛必大熱作渴欲飲凉水舌必有刺不似陰症之口不渴而舌胎滑也法當清胃火不必止其血方用石膏三錢青蒿五錢香薷三錢荊芥一錢當歸三錢人參三錢水煎服此方乃正陽症吐血之神劑也方中雖有解暑之味然而補正多於解暑去香

蕭一味實可通治諸陽症之血也。但此方止可用一二劑。卽宜改用六味地黃湯以滋其陰。水足則陽火自消耳。一則陽症之火。瀉也完穀不化。飲食下喉卽出一日或瀉十餘次。或瀉數十次。或晝夜瀉數百次。人以爲熱也。然而熱之生也。何故生于腎中之水衰。不能制火。使胃土關門不守於上下。所以直進而直出也。論其勢之急迫奔崩。似乎宜治其標。然治其標不能使火之驟降。必須急補腎中之水。使火有可居之地。而後不至於上騰。方用熟地三兩。山茱萸一兩。車前子一兩。甘草一兩。茯苓一兩。白芍三兩。肉桂三分。水煎服。此方乃補腎之湯。非止瀉之藥也。然而止瀉之妙。捷如桴鼓。蓋腎水一生腎火。卽降。頃刻應。

驗非好爲奇談而不據實理也若止作冒虛有火治之未嘗無功終不若此之捷○脾約丸亦佳安能及此方之神哉

華君曰與余同不必講

雷公曰無一論不奇妙





假治法

論假熱假寒

天師曰假治者病是假熱而治以假熱之方症是假寒而治以假寒之藥也如人喉痛口乾舌燥身熱人以為熱而非熱也內真寒而外現假熱耳如人手足冰冷或發厥逆或身戰畏寒人以為寒而非寒也內真熱而外現假寒耳此時看症未確死生反掌吾以假熱之藥治假寒之症以假寒之品治假熱之病是以假對假也假寒方附子一錢肉桂一錢人參三錢白朮五錢猪胆汁半箇苦菜汁三匙先將藥二碗水煎好以水水泡涼入猪胆汁苦菜汁調勻一氣服之即愈方中全是熱藥倘服之不宜必然虛火上冲盡行嘔出吾以熱藥涼服已足順其性而下行況又有苦菜汁胆汁

之苦以騙其假道之防也。蓋上熱之症下必寒。極熱藥入之。至於下焦投其所喜。無柰關門皆爲強賊所守。非以間隙結之。必然拒絕。而不可入。內無根草。外無救援。柰之何哉。吾今用胆汁菜汁。以與守關之士。買其歡心。不特不爲拒絕。轉能導我入疆。假道滅虢。不信然哉。○至於假熱之方。則又不然。心胸之內。全是一團邪火。盤踞於中。焦若不直搗中堅。巨魁不擒餘黨。安能星散。然而用師無法。則彼且力拒死關。而不可救。方用黃連三錢。柴胡二錢。白芍三錢。當歸三錢。炒梔子二錢。半夏三錢。枳殼一錢。茯苓三錢。葛蒲三分。水煎服。此方妙在用黃連一味。直入心經。佐以梔子。副將單刀直入。無邪不散。又柴胡白芍。瀉其運糧之道。又半夏枳殼。斬殺

餘黨中原既定四隅不戰而歸正矣然而火熱居中非用之得宜則賊勢彌空安能直入又加葛蒲之辛熱乘熱飲之則熱喜同熱不致相反而轉能相濟此又假治之妙法也

張公曰講得透徹痛快予又何說之詞然而假熱假寒不止此二症也吾再廣言之如人氣喘不安痰涎如鋸而不止者人以爲熱而非熱也乃下元寒極逼其火而上喘也此最急最危之症苟不急補其命門之火與腎水則一線微陽必然斷絕方用熟地四兩山茱萸三兩麥冬三兩北五味一兩牛膝一兩附子一錢肉桂一錢水水泡冷服之一劑卽愈附子肉桂所關奪門之藥其性最熱倘不用之於熟地山茱萸北五味之中則孤陽

乘大熱之勢沸騰而上矣方中妙在用熟地山茱萸之類使足以濟火又麥冬以滋肺金之化原使金去生水而水益足以生火而火不敢於飛越况又有牛膝之下走而不上行乎然必承水泡之騙其上焦之熱直至腎宮腎宮下熱則上焦清涼火自歸舍又何患喘與痰作祟哉更有眼目紅腫經年不愈者人以爲熱而不知非熱也亦腎火上升而不下降耳法用六味地黃湯加麥冬甘菊花白芍當歸各三兩柴胡五錢各爲末蜜爲丸每日吞服五錢一料必全愈此雖病輕而世人多患之述而不悟予所以特表出也雖非假治之法而症寔假熱之症可觸類而旁通之耳假寒之法莫妙岐天師之方可以統治矣故不

再傳

華君曰亦同

真治法

論真熱真寒

當是大青  
一減麻桂知  
我麻杏甘  
石之症也

天師曰真病原難分晰然有假即有其也即以前症言之如人喉  
痛口乾舌燥身熱與假熱無異然而此曰真熱者何以辨之假熱  
之症口雖渴而不甚舌雖乾而不燥即燥而無芒刺無裂紋頭雖  
痛而日間輕身雖熱而有汗不若真熱之症口乾極而呼水舌燥  
極而開裂生刺喉日夜痛而不已身大熱烙手而無汗也方用麻  
黃三錢黃連三錢黃芩三錢石膏三錢知母三錢半夏二錢枳殼  
二錢甘草一錢當歸五錢水煎服一劑輕二劑愈此方純用寒涼  
之藥以祛其火火一去而上焦寬快矣更有人手足冰冷或數  
厥逆身戰畏寒與假寒無異然而謂之真寒者何以辨之假寒之

症手足冰冷或有時溫和厥逆身戰亦不太甚有時而安然有時而發搐不若真寒之症手足寒久不回色變青紫身戰不已口噤出聲而不可禁也方用附子三錢肉桂一錢乾姜一錢白朮五錢人參一兩急救之此乃直中寒邪腎火避出軀殼之外而陰寒之氣直犯心官心君不守肝氣無依乃發戰發噤手足盡現青色也然則止宜用附桂乾姜祛逐其寒邪足矣何以又用白朮人參且少用亦是濟用何以多加如許也蓋元陽飛越止一線之氣未絕若不急用人參返氣於若存若亡之際而徒用桂附乾姜一派辛辣火熱之藥邪雖外逐而正氣亦就垂絕故不若多加於危急之際則敗軍殘卒見有孤軍未亡而又驍勇之將號召散失有不再



整旗鎗共奔燕下者乎此真治之妙也

張公曰奇論天開真治卽血治真治其本病而不必以假藥騙之對症用藥可也余不再論

華君曰亦同

男治法

論狐疝 論強陽不倒  
論痿陽不振

天師曰男子與女子之治原無分別然而亦有殊處男子與婦人殊者疝病陽強不倒痿而不舉疝病不同然而與婦人異者止狐疝不同耳餘俱相同狐疝者日間縮在囊之上夜間無在囊之下也此乃寒濕又感陰陽不正之氣乘於交感之際或在神道之旁或在風濕之際感而成之也方用杜若五錢搗汁以涼水洗之取汁一碗加沙參一兩肉桂一錢桂枝一錢小茴香一錢橘核一錢水煎服一服即伸出二服即消三服全愈神方也○強陽不倒此虛火炎上而肺金之氣不能下行故爾若用黃柏知母二味煎湯飲之立時消散然而自倒之後終歲經年不能重振亦是苦地方

并

用元參三兩肉桂三分麥冬三兩水煎服卽倒此方妙在元參以  
爲腎中浮遊之火尤妙肉桂三分引其入宅而招散其沸越之火  
同氣相求火自回合況麥冬又助肺金之氣清肅下行以生腎水  
水足火自息矣此不求倒而自倒他日亦可重整戈矛再圖歡合  
耳○至於痿而不振者乃過於琢削日泄其腎中之水而腎中之  
火亦日消亡蓋水去則火亦去必然之理如一家人口厨下無水  
又何以煮爇而生烟必汲其泉源而後取其薪炭可以鑽燧取火  
以煮飲食否則空鑪安爇也方用熟地一兩山茱萸四錢遠志一  
錢巴戟天一錢肉苁蓉一錢肉桂二錢人參三錢枸杞子三錢扶  
神二錢杜仲一錢白朮五錢水煎服一劑起二劑強三劑妙老人

倍加此方用熱藥於補水之中則火起而不愁炎燒之禍自然煮湯可飲煮米可食斷不致焦釜沸乾或虞爆碎也此皆男治之法也

張公曰男治法妙然余亦有數方可並傳之狐疝方用白朮五錢沙參一兩柴胡三錢白芍三錢王不留行三錢水煎服一劑即出而不縮○陽倒不舉方用熟地一觔肉桂三兩覆盆子三兩黃芪二觔巴戟天六兩栢子仁三兩去油麥冬三兩當歸六兩白朮八兩各爲末蜜爲丸每日白滾湯送下一兩自然陽旺不倒矣

孫真君傳治疝方用沙參一兩橘核一錢肉桂一錢柴胡一錢

白芍五錢陳皮五分吳茱萸五分水煎服一劑卽定痛二劑卽  
全愈疝氣一症大約皆肝木之病予所以治其肝自隨手而奏  
功也

妙

女治法

論風邪入血室  
陰門生瘰  
論治瘰  
陰內生虫

天師曰女症各經俱與男人同治惟是經症宜知至於瘰隱之症更宜留心身也經期前後寒熱溫涼有邪無邪俱當細辨世有專門不須枚舉我今止據一症而言之如婦人經期適來為寒風所中則經水必然驟止經不外泄必變為寒熱時而身戰時而身涼目見鬼神心中驚悸論治法本當刺其期門之穴一刺出血立已無奈世人不肯刺於乳下羞恚不肯為醫人所見於是必變而益發狂呬語所由來也今立一方治之方用柴胡三錢當歸二錢白芍五錢枳殼二錢炒梔子三錢甘草一錢陳皮五分生地二錢水煎服此方妙在用柴胡於白芍之中蓋前症經血不能外出則血

藏於血室之中藏而不出則血化爲熱氣鬱結不申必在半表半裏之間以與妖作怪柴胡真半表半裏之藥用白芍直入血室和平而分解之如人羞恚隱藏於血宅之內必得一相信之人走入其中爲之開導而後衆人排闥而入庶幾一笑回春仍然歡好身出而禍亦消此方之妙理實相同故取而顯譬之非好爲論說也至於羞隱之症亦不可枚舉查其專門而細詢病情隨症加減治之可耳

張公曰論奇關子更有說熱入血室非熱也乃風邪壅之而熱也所以用柴胡一散而愈。婦人羞隱之處不便明言然大約非寒則熱耳今有一試方先用柴歸三錢白芍三錢川芎一錢

熟地五錢甘草一錢柴胡一錢以芥子一錢黃芩三分炮薑三分水煎服倘有羞隱之處不肯明言者以此方投之必奏奇功問之服藥後較前平善則是虛症也竟用四物湯治之可也未好則是熱病作祟方中大加梔子三錢治之必奏功也此亦妙法行醫者宜亟知之

華君曰女子治法尚有二條未傳待予補之婦人陰內生虫乃濕熱也用鷄肝入藥末引之亦妙終不若夫子之方更神也方用蚯蚓三四條炙乾爲末用葱數條火上炙乾爲末用蜜一碗煮成膏將藥搗於其中納入陰戶虫盡死矣自然隨溺而下神方也世人未知幸爲留意○又婦人陰門邊生瘡作痒作痛



不止者以此方煎水洗之立效方用蛇床子一兩花椒三錢白  
礬三錢水十碗煎五碗乘熱燂之溫則洗之一次卽止痒二次  
卽止痛三次卽全愈分作五日洗之每日止消洗一次神效之  
極幸珍之

虛治法

論氣虛血虛

天師曰虛症亦多我舉一二以概其餘虛治者非氣虛卽血虛也  
氣虛如人不能飲食食之而不能化者是血虛者面色黃瘦或出  
汗盜汗或夜眠常醒不能潤色以養筋者是也蓋飲食入胃必須  
胃氣充足始能化糟粕而生津液氣既自餒何能化飲食也方用  
人參二錢黃芪三錢白朮三錢陳皮五分甘草一錢麥芽五分神  
麴五分山查五粒炮姜一錢茯苓三錢水煎服此方參苓芪朮純  
是健脾開胃之品又恐飲食難消復加山查神麴麥芽之類以消  
之則胃氣既旺又何愁飲食之不化津液之不生耶○血虛自當  
補血舍四物湯又何求耶余今不用四物湯用麥冬三錢熟地一

兩桑葉一片枸杞子三錢茜草一錢當歸五錢水煎服此方妙在  
用桑葉以補陰而生血又妙加入茜草則血得活而益生况又濟  
之熟地麥冬當歸大劑以共生之則血足而色潤筋舒也外症既  
見改觀則內自安而寐適心氣得養又寧有盜汗之生哉此虛治  
之法也

張公曰虛治亦不止補氣補血蓋此二方實可統治之甚矣天  
師立方之妙也別有加減之法氣虛方中倘傷米食加麥芽五  
分傷肉食加山查十粒傷麵食加蘿蔔子五分有痰加半夏一  
錢白芥子一錢咳嗽加蘇子一錢桔梗二錢傷風柴胡二錢夜  
臥不安加炒棗仁二錢胸中若微疼加枳殼五分血虛方中亦

同前加減法治之

華君曰尚有一方併傳子有氣血兩虛之人飲食不進形容枯槁補其氣而血益燥補其血而氣益餒助胃氣而益汗難止補血脈而胸膈阻滯法當氣血同治方用人參一錢白朮一錢甘草八分陳皮五分茯苓二錢當歸二錢白芍三錢熟地三錢川芎一錢神麴五分麥冬五錢穀芽一錢水煎服此方氣血雙補與八珍湯同功而此更妙于八珍者也妙在補中有調和之法耳

# 寔治法

論寔寔邪

天師曰寔病亦不同亦甚多今亦舉其一二如人終歲終年不畏勞役不辭辛苦寒涼之品可以多食辛熱之味不能上口者是也至於邪氣之入不可同觀吾言寔病之多皆邪氣之多也人實者少而虛者多邪氣之入別有治法不可混入於此門倘人有強壯之容顏過於熱甚欲求方者與之方用陳皮一錢神麴一錢麥芽一錢黃芩一錢厚朴一錢天花粉一錢甘草五分芍藥二錢山查十粒枳殼五分當歸二錢茯苓一錢水煎服此等方止可備用以治有餘之人不可據之以概治天下之人也蓋寔者一百中一二入而虛者徧天下天地之氣何能過厚况培植者少而琢削者多

乎今定此方亦定一門之治法非教醫者執此以消導之耳

張公曰仁心仁術於此方並見寔病甚少

天師言多者乃言邪氣之寔非言正氣之寔也邪氣之寔傷寒門最多天師言有專門者說有傷寒之書也倘人病邪氣之寔幸於傷寒門查而治之無差毫髮傷寒書卷繁多茲不能備載耳

華君曰予未傳

# 寒治法

論吐血衄血 目腫 口舌生瘡

天師曰寒治者乃火盛而正折之也如人病目痛口舌生瘡鼻中出血口中吐血是也此等之症乃火氣鬱勃于上焦不能分散故重則上冲而爲吐血衄血輕則目痛而口舌生瘡也法當用寒涼之品以清其火熱燎原之勢并瀉其炎上巔頂之威方用生地一兩當歸一兩川芎五錢元參五錢黃芩三錢三七根末三錢甘草一錢荊芥炒一錢水煎服此方妙在不純用寒涼以逐火而反用微寒之藥以滋陰蓋陰氣生則陽氣自然下降尤妙用荊芥引血歸經用三七末以上截其新來之路又加黃芩以少清其奔騰之勢誠恐過於寒涼恐冷熱相戰又加甘草以和之此治熱之最巧

最妙法也。若竟用寒涼折之，非不取快一時，然火降而水不足，則火無所歸，仍然焰生風起，必較前更勝而始以清補之藥救之，則胃氣已虛，何能勝任？予所以乘其初起，即用之爲妙也。○目腫而痛，亦是火症，然必看其眵多淚多，紅腫而痛，如有物針觸，一般用柴胡三錢，甘草一錢，炒梔子三錢，半夏一錢，白蒺藜三錢，水煎服。此方之妙，全在直散肝胆之鬱火，火散則熱自退，不攻之攻，勝於攻不下之下，勝於下也。一劑即可奏功，正不必再服。○口舌生瘡，又不可如是治之，乃心火鬱熱而舌乃心苗，故先見症，法用黃連三錢，菖蒲一錢，水煎服，一劑而愈，神方也。此方不奇在黃連，而奇在菖蒲。菖蒲引心經之藥，黃連雖亦入心經，然未免肝脾亦入，未



若薑蒲之單入心也。況不標之以各經之品。孤軍深入。又何疑哉。此所以奏功如响也。倘不知用藥神機。輕混之以肝脾之藥。雖亦奏功。終不能捷如桴鼓。此治熱之又一法也。

張公曰。寒治之法。世人最多。予皆不取。今天師之法。不容予不首折也。用寒而又遠。寒用散而又遠。散真奇與巧。並行而攻。與補兼用也。予又何必多言哉。無已。則更有一方。在治火初起之時。尚未現於頭目口齒之際。亦可化有爲無。方用柴胡二錢。白芍三錢。甘草一錢。炒梔子三錢。半夏一錢。羌活五分。茯苓三錢。水煎服一劑。可以散火。方名先解湯。乘外症之不見而先解之。亦爭上流法。醫者宜留意焉。

華君曰亦無有傳我

孫真人曰于有吐血方傳子生地汁一碗無鮮生地處用乾者  
一兩煎湯半碗調三七根末三錢炮姜炭末五分服一劑卽止  
血神効衄血亦可治妙

熱治法

論腎寒吐瀉  
論心寒胃弱

男 習余

天師曰熱治寒也寒症不同舉一二症言之如嘔吐不已食久而  
出是也或下利不已五更時分痢瀉四五次是也此等之病人皆  
以為脾胃之寒治其胃則嘔吐可止治其脾則下利可遏然而終  
歲經年服胃脾藥而不愈者何也不得其故耳蓋胃為腎之關而  
脾為腎之海胃氣不補命門之火則心包寒甚何以生胃土而消  
其穀食脾氣不補命門之火則下焦虛冷何以化其糟粕而生精  
微故補胃必宜補腎而補脾亦宜補腎也方用熟地三兩山茱萸  
二兩茯苓三兩人參三兩肉桂二兩附子一兩北五味一兩吳茱  
萸五錢山藥四兩各為末蜜為丸飢服一兩此方之妙全在用腎

藥居多而脾胃藥居少尤妙用熱溫之藥於補腎補土之中則火足而土健誰知水足而火生也此種議論舉世未聞然豈徒托空言以示奇乎定有至理存焉試之無不效奏頃刻願世人加意之此熱治之妙法一方可兼治之凡如此等之病無不可充而兼治也

張公曰真妙絕之論快心之語 天師言補腎之法而余更有論乃言補心方也胃與脾雖同是屬土而補胃補脾宜辨凡人能食而食之不化者乃胃不病而脾病也當以補脾而補脾尤宜補腎中之火蓋腎火能生脾土也有人不能食食之而反安然者乃胃病而非脾病不可補腎中之火當補心中之火蓋心

火能生胃土也世人一見人不能飲食動曰脾胃之病而不知  
分胃之寒虛實之心分脾之虛寒而責之腎也 天師之法心  
腎兼補乎可不必更立奇方然而治脾胃兩虛者用之神效若  
單是胃虛胃寒者自宜獨治心之爲妙余所以更定一方以佐  
天師之未及方用人參一兩白朮三兩扶神三兩菖蒲五錢良  
姜五錢蓮肉三兩山藥四兩半夏三錢白芥子三錢附子三錢  
遠志二兩炒棗仁五錢白芍三兩各爲末簍爲丸每日白滾水  
送下二錢飯後服此方專補心火并疏肝氣專生心火內加附  
子良姜以助火熱之氣心火足自然生胃土胃土足而飲食自  
然能進而無害矣此方實可濟 天師之未及也

石室秘錄

卷之二十一

與

本館

華君曰治法與余相同無可言

通治法

論痢下通治  
論下血通治

論火瀉通治

天師曰通治者因其通而通之也如人病下痢者是痢疾之症多起於暑天之鬱熱而又感以水濕雨露之氣以成之紅白相見如血如膿甚者如屋漏水如魚凍水裡急後重崩迫痛疼欲下而不能不下而不快一日數十行或一夜數百行或一夜數千行氣息奄奄坐而待死此通之病也若驟止其邪則死生頃刻不止其邪則危絕如絲欲補其氣則邪氣轉加欲清其火則下行更甚此時惟有因勢利導之法可行於困頓之間或疑人已氣虛血敗更加利導必致歸陰不知邪氣一刻不去則正氣一刻不安古人之痢疾無止法信不誣也方用白芍三兩當歸三兩蘆薈子一兩枳殼

此方已  
有止分  
兩不同耳  
多車前子  
一味

三無用大藥  
其通因通因

三錢檳榔三錢甘草三錢車前子三錢水煎服一劑即止二劑全  
安可用飲食矣此方之奇而妙者全在用白芍當歸蓋水瀉最忌  
當歸之滑而痢疾最喜其滑也芍藥味酸入肝以平木使木不敢  
再侵脾土又有枳殼檳榔消逐其濕熱之邪又加車前分利其水  
濕而又不耗真陰之水所以功勝於茯苓也尤奇者在用蘿蔔子  
一味世多不解蓋蘿蔔子味辣而能逐邪去濕且又能上下通達  
消食利氣使氣行於血分之中助歸芍以生新血而祛滯其敗淤  
也少加甘草以和中則無過烈之患此奏功之神奇實有妙理耳  
張公曰固然奇妙通權通因通用痢疾立論最為妥當然而通  
因之法不止痢疾也水瀉亦是下血亦是也水瀉者人見其如



潮而來如瀑而下皆曰急宜止之以免亡陰之症用粟殼炒粟  
烏梅之類止之其論則是其治則非也木瀉雖不比痢疾之斷  
不可止然而水瀉之中亦有不可遽止之病如疼痛於腹中後  
重於門口皆是有火而瀉不比虛寒之直瀉俱當用通因之法  
治之方用人參三錢車前一兩白芍三錢檳榔一錢甘草一錢  
治之此方之妙妙在車前以滑之而又佐以檳榔之去積自然  
有滯皆行況車前性雖滑而能分消水穀則水氣自然分開第  
大瀉之後自然亡陰又用人參以補氣則氣足而陰自生又慮  
久瀉自然虧中又加甘草以和之雖是通因之法實乃扶正之  
方下血之症其人之血虛言可知似乎宜補其血矣然而血

解熱

石室秘錄

卷之五

五

本

之下也必非無故非濕熱之相侵卽酒毒之深結若不逐去其濕熱酒毒而徒尚止澀之味吾未見其下血之能止也方用熟地一兩地榆三錢白芍三錢當歸三錢黃連三錢甘草一錢葛根一錢作樹枝五錢水煎服一劑必下血更多二劑畧少三劑全愈蓋此病不用通因之法永不奏功必如此而能愈也方中妙在用熟地當歸芍藥以生新血新血生則舊血必去又妙在地榆以涼大腸用柞木以去酒毒所以相濟而成功也此二方亦通因之妙用人亦畧宜知之

華君曰同

甯公曰通因通用張公補論之尤爲酣暢我無以贊二言雖然

尚有一說在大瀉之後雖是火瀉畢竟宜溫補之以生其陰瀉  
一止卽宜用四物湯加人參熟地以溫補而不可謂水瀉忌滑  
而禁用歸熟也

痢症按背賢謂如屋漏水者爲不治症魚凍水者爲虛寒症  
後方恐宜酌用李于永

塞治法

論氣虛中滿

論飽食填塞

天師曰塞者因其塞而塞之也如人氣虛中滿是也凡人氣虛多不能食食則飽他人以爲多食之故以香砂枳實等丸消導之其初未嘗不少快久則腹飽又消之久久不已必變成中滿之症矣腹高而大氣喘而粗人又以爲腹脹也用牽牛甘遂等藥以利導其水水未必去而腹脹益甚又以爲藥之不勝也又用大黃巴豆之藥下之又不應以爲風邪藥之又以辛散之品如龍膽草茵陳之類襍然紛進不至成不止猶然開鬼門泄爭府紛紛議論皆操刀下石之徒也誰知初起之時卽以補胃健脾之藥先爲速治何至此哉初用之方用人參一錢白朮二錢茯苓三錢陳皮三分甘

草一分蘼芎子一錢薏仁五錢芡實五錢山藥三錢水煎服此方  
絕不去消焦而專以補爲事世醫未有不笑其迂以爲此等藥服  
之必增脹滿下喉之時實覺微飽世醫乃謗示曰吾言之驗如此  
而病人與病家并諸親友俱嘆世醫而咎此方之迂而害事也詎  
知下喉之時雖覺微脹入腹之後漸覺開爽連服數劑不特開爽  
而并無脹滿之疾矣蓋中滿之疾原是氣虛而成不補其虛脹何  
從解補藥之中加以蘼芎子分消其脹氣使人參不敢助邪而反  
助正况又有茯苓薏仁芡實之類純是去濕之藥則水道自行而  
上壅可免尤妙用甘草一分以引藥之入於滿處蓋中滿最忌  
甘草而余偏用之成功於忌之中也

能食諸寒  
運用溫法  
不當不外吐  
胃耳即胃  
之宜先消  
補

張公曰妙論叠出不窮大哉聖人之語中滿固是塞症飽食填  
塞於胸膈亦是塞症也人皆用香砂厚朴消之而予獨不然方  
用人參三錢白朮三錢陳皮一錢甘草一分肉桂一錢神曲三  
錢水煎服此方妙在全不去消食反助其飽悶之氣誰知飽食  
而不消者由於胃氣之不足也我補其胃氣則胃強自能運化  
而入於脾中又何必用厚朴枳殼之消導哉此亦塞治之法也  
可與 天師方並垂天壤

華君曰法同於余而論備之

雷公曰我亦有方中滿病固是胃氣之虛然徒補胃氣亦難療  
當補心火以生胃土方用人參三錢白朮五錢炒棗仁五錢遠

六法可宗

志八分山藥三錢茯苓三錢米仁五錢陳皮三分神麴三分麥  
芽五分水煎服方中全不治滿而滿自除正以治心火也

食復也不名結  
至各經群起而  
及五藏六府諸  
機等語甚難見  
祇令人捧腹耳  
約傷寒初愈  
未盡元氣未復  
液未充一旦飽  
則氣不能運津  
能潤遂至滯而  
下故空腹數日  
然後生津之藥  
得以降而食之  
耳

# 解治法

論結胸  
論內傷肝鬱

天師曰解者邪聚於一處而分解之也如人病結胸等症者是傷  
寒初愈五藏六腑久不見飲食矣一旦飽食則各經群起而盼無  
如胃經火熾一甌之物不足以供其自食又安能分散於諸人乎  
勢必群起而爭而胃經自家困乏茹而不吐則五藏六府詭譎擾  
攘而胃經堅不肯出矣然則治之法奈何惟有堅壁以待枵腹以  
守則敵人自散蓋原因無食所以起爭使終無糧草勢亦難于久  
待自然仰闕而攻不戰自退乘其散亡之時少佐師旅聲言追逐  
實仍和解彼此同歸於好方用元參一兩麥冬一兩水二碗煎服  
此方之妙全不去顧胃中之火亦不去消胃中之食止分清肺中



之氣散其心腎浮游之焰。心腎肺經既已退舍。則肝經二旅之師。又何能爲難哉。脾與胃唇齒相倚。從前不過同羣共逐。大家聲揚。原未嘗有戰攻之舉。今心肝肺腎之火既已收師。則脾藏一經亦自相安於無事。次倘一逢結胸。卽以此方投之。則不特無功。轉且有害。故一遇結胸之病。必須令其空腹數日。而後以此方投之。萬舉萬當。此解治之一法也。

張公口真妙絕。奇文結胸之症。不意發如許奇語。非天仙又烏能哉。我欲再發一言。不可得矣。非學貴天人。不可言醫。非識通今古。不可談醫。非窮盡方書。不可託醫。此得人所以最難。自古及今。代不數人。元以前無論明朝三百年止。得數人而已。李

平湖之博經仲仁之辨辭立齋之智近則李自才之達喻嘉言  
之明通吾子之弘肆我所言者數人皆上闢星宿種山川之靈  
而生者也今日既許子在著書中人願吾子勿以菲薄自待也  
著書當弘而辟醫道盡矣至之化矣神矣 解法更有人病內  
傷而頭疼目疼心脇痛遍身痠手足又痛此皆肝氣鬱蒸之故  
或頭痛救頭脚痛救脚治何日始能盡期當據其要而先治之  
餘者不治自愈方用白芍五錢當歸三錢柴胡三錢天花粉三  
錢丹皮三錢梔子三錢甘草三錢川芎一錢香附一錢桂枝一  
錢水煎服此方妙在白芍爲君柴胡爲臣祛風祛痰之藥爲佐  
使一劑而脇痛失再劑而諸痛平三劑而一身泰真扼要爭奇

解法之至妙者施之內傷之症尤多奇功願世人動而用之收功無量也

華君曰未傳于予

欬治法

論亡陽

論下血

論吐血

論頭汗

論手汗

天師曰欬治者乃氣將散而收欬之也譬如人汗出不已此亡陽而氣欲散也又如下血與吐血不已此血欲散而不能住者是也氣散僅存一線之陽倘再令其奔越則陽脫而死所不免也然而治脫之法惟在欬其肺氣使皮毛腠理固密則陽從何散第徒欬肺氣而不大補元陽則元氣仍然欲脫卽不脫出于皮毛腠理必脫出于口鼻耳目故必以補爲欬之爲得也方用人參一兩黃芪一兩當歸一兩五味子一錢山茱萸四錢桑葉五片酸棗仁一錢麥冬三錢水煎服此方之妙全在用參歸以補氣用山萸五味以欬氣則補足以濟欬之功而欬足以滋補之益况又有桑葉收

生新  
七亦能  
血不止  
血止

汗之妙品調停於飲之中不偏於飲亦不偏於補也。○下血之症  
多因好酒成病用解酒之品可以成功而殊不盡然也世醫所用  
酒之品無過乾葛桑白皮而已然而乾葛不可多服而桑白皮  
又氣味輕清不可專任此三味所以解酒而酒病終難去也況中  
酒之病其來已素非一朝一夕之有豈是輕清不可久服之藥可  
能治之乎余故皆棄而不取方用人參二錢當歸一兩地榆三錢  
生地五錢三七根末三錢水煎服此方之妙全在不去治酒病亦  
不去治血病全以生地當歸活其血血活則新血生而舊血止况  
又佐以地榆之寒以去大腸之火又佐以三七之末以杜塞大腸  
之竅自然血止而病愈也此飲之一法也。更有吐血之症或傾

益或盈碗若不急以收歛則吐將安底然而一味酸收寒過則血  
勢更狂愈足以恣其崩騰之勢不若從其性而少加以收歛之品  
則火寢息而血歸經方用人參一兩當歸一兩酸棗仁三錢三七  
根末三錢水煎調服此方之妙不去止血而惟固其氣蓋血脫益  
氣寔有奇功血乃有形之物既已傾盆盈碗盡情吐出則一身之  
中無血以養可知自當急用生血補血之品尤以爲遲奈何反用  
補氣之味得無迂而寡效乎誰知血乃有形之物氣爲無形之化  
有形不能速生而無形寔能先得况有形之物必從無形中生之  
氣無形始能生血有形之物補氣正所以補血生氣正所以生血  
也况血既盡情吐止存幾希一線之氣若不急爲補之一旦氣

絕。又何以生血而補血哉。經云有形之血不能速生無形之氣所當急固真治血之妙法此又斂之之一法也

張公曰真有不可思議之妙余無以贊一詞矣止語汝頭汗出而斂之法凡人頭頂出汗乃腎火有餘而腎水不足若不知其故而徒用止汗之藥必致目昏而耳痛法當滋其腎而清肺金之化源自易奏功如嚙方用桑葉一斤熟地二斤北五味三兩麥冬六兩各爲末蜜爲丸每日白滾水送下五錢或一兩一月後永不出汗矣更有入身飯之時頭汗如雨落者此又胃火勝而非腎火餘也法當用元參一斤麥冬一斤天冬一斤生地一斤北五味四兩酸棗仁半斤各爲末蜜爲丸每日白滾水送下

一兩二月必愈似乎胃火勝宜用竹葉石膏湯而余偏不用者  
何也蓋胃火之勝者微勝耳非若熾盛而火炎奔騰而熱發不  
過因飲食之味入於胃中遂覺津津汗出飲食完而汗隨止然  
則以元參一味解之有餘矣况又用天麥二冬以清肺火生地  
以涼血酸棗仁以平心火五味子以收汗而滋液則胃經有火  
之盛亦已消磨况原未十分之盛乎此欽法之一也手中之汗  
細小病也不必入於此中以藥水洗之卽愈俟後可入處子當  
言之

華君曰亦未傳



升治法

論陽虛下陷

陰虛下陷

天師曰升治者乃氣虛下陷不能升而升之者也凡人因飢飽勞役內傷正氣以致氣乃下行脾胃不能化飲食不能運動往來變成癆瘵若疑飲食不進爲是脾胃之火或疑肉黍所傷謂是水穀之積輕則砂仁枳殼山查麥芽之類重則大黃芒硝牽牛巴豆之品紛然雜進必致腹悶不已倘先以升提之藥治之何成此等病症哉方用人參一錢黃芪三錢柴胡一錢升麻三分當歸三錢陳皮一錢甘草一錢白朮三錢治之此方卽補中益氣湯余爲之增定其輕重以爲萬世不刪之定則東垣一生學問全在此方凡

人右手寸脉大於左手寸口之脉無論其左右關脉與左右腎脉

之大與小沉與浮卽以此方投之無不神效蓋右寸之脉大於左寸口卽內傷之症也此方寔爲對病妙在用柴胡升麻二味雜於參芪歸朮之中以升提其至陽之氣不使其下陷於陰分之間尤妙加甘草陳皮於補中解紛則補者不至呆補而升者不至偏墮所以下口安然奏功如响耳或疑參芪太多不妨畧減則可倘以爲補藥不可驟竟去參芪則柴麻無力譬如繩索細小欲升千觔重物于百丈之上難矣或用參而不用芪或用芪而不用參則功必減半然猶勝於盡去之也倘以升柴提氣或疑清氣不升反又濁陰之騰上者此必左手寸口之脉大於右手寸口始可借言苟或不然殺人無算必是此人創說也余最惡此等似是而非爲吾

道之經也。子蓋聞之也。

升陰  
此方奇  
不意  
張公見及  
爾外曰張  
公之方妙  
甚真補天  
乎也

張公曰：補中益氣湯從無有如此痛快者。東垣何幸得如是之藥，揚哉！余何言乎？惟是陽虛而下陷者，宜如是升提陰虛而下陷者，又當何法以升提之乎？天師不言，子當增入。譬如人陰虛，脾洩，歲久不止，或食而不能化，或化而漉泄是也。方用熟地五錢，山茱萸五錢，北五味一錢，白朮一兩，山藥三錢，車前子一錢，肉桂一錢，茯苓三錢，升麻三分。水煎服。此方之妙，純是補陰之藥，惟加升麻三分以提陰中之氣。陰氣升而瀉自止。乃又有溫熱之味，以煖命門而健脾土，又何至再行瀉泄哉？天師乃升陽氣之論，而余乃補升陰氣之湯也。有此二方可與乾坤

不老

華君曰亦未傳

墮治法

論腹痛二症

天師曰墮治者不能下降用藥以墮之也如腹中痛手按疼甚或胸中傷食手不可按者皆宜墮之也方用白朮二錢枳殼三錢白芍三錢甘草一錢山查二十粒麥芽三錢厚朴一錢水煎服論理胸中既然傷食但用麥芽厚朴山查枳殼消之足矣何以又加白朮與白芍蓋傷食而食不能化所以結在心胸以致作痛若徒消食而不健脾胃之氣則土虧而物難運轉故必用白朮以健其胃口之氣以生其脾內之陰則土氣有餘何難消食然而心胸飽悶則肝經乘我之困來侵脾胃之土又加白芍以平肝木則木弱而脾胃之土自安自可順還以化糟粕矣此墮治之妙法也至于邪

氣扶食存於大腸大腸之內火氣炎蒸夫食作祟故痛而不可手按是食已離脾胃可攻之宜下方用大黃三錢芒硝一錢厚朴一錢柴胡一錢黃芩一錢甘草一錢治之此即大承氣湯也此方之妙全在用大黃芒硝二味蓋大黃性涼而散又善走而不守芒硝性更繁於大黃但其味寒熱佐之黃芩則相濟有功尤妙仍用柴胡以舒其肝經之邪氣又佐以厚朴之祛滯若邪甚者或再加枳寔尤易成功此墮之又一法也

張公曰不可思議之論予何言即必欲予言又有二症相商有人成痞塊之症一時發作而腹痛亦不可手按者亦可用下墮之法蓋乘其邪動而墮之也方用枳寔一兩白朮二兩馬薤炒

焦五錢酒煎服蓋馬糞最能安痛又不傷氣且又能逐邪而化  
物藥箱中最宜先備而不用也蓋倉猝間不可即得此物愈久  
愈妙不必多用至五錢卽一二錢用之無不奇妙今況用之五  
錢乎况又與枳寔同用則積塊自消然而徒消其積未免恐傷  
脾陰又佐以白朮二兩大補其脾氣則馬糞與枳寔可以施其  
祛蕩之功此又墮治之妙法也

華君曰亦未傳

雷公曰我尚有墮治之方如人腹痛手不可按方用枳寔一錢  
大黃二錢生甘草一錢白芍五錢乳香末一錢水煎服此方之  
妙用攻於和解之中不十分攻邪而邪自退舍此墮治之最善

方林奇

者也



原缺

錢半夏一錢治之自安此乃開治之一法也

張公曰論奇而方妙中風之症亦可用瓜蒂散皂角湯以開之然必須用人參一兩半夏三錢南星三錢附子一錢以繼之也不則徒用瓜蒂皂刺徒取一時之開闔而終不能留中氣之堅固雖開闔何益哉

華君曰尚有二法未傳一陰陽湯也法用滾水凉水各一碗均之加炒鹽一撮打百餘下起泡飲之凡有上焦欲吐而不能吐者飲之立吐而愈○一噴嚏之法未授也用生半夏三錢爲末水丸如黃豆大入鼻孔中則必噴嚏不已用水飲之立止通治中風不語尸厥等症中惡中鬼俱妙皆開治之法也

關隔症上不得入下不得出病在上下二焦而根實本於中焦

俞嘉言以

退法兼朝服八味丸治之甚善附

以俟臨症者之自擇方法詳醫門法律關隔條茲不贅

李士

閉治法

論交感脫精  
論夢遺脫精

天師曰閉治者乃虛極下脫關門不閉而閉之也如人交感樂極男女脫精而死者或夢遺精滑不守者是也男女走精而亡亦因氣虛不能自禁一時男貪女愛盡情縱欲以致虛火沸騰下元盡失先洩者陰精後洩者祀血血盡繼之以氣而已當此之時切不可離爐仍然抱住男脫則女以口哺送其熱氣女脫男以口哺送其熱氣一連數口呵之則必悠悠忽忽陽氣重回陰精不盡全流出倘一出玉爐則彼此不相交接必立時身死然苟能以獨參湯數兩急煎之內可加附子一錢乘熱灌之亦有已死重生者蓋脫症乃一時暴亡陽氣未絕止陰精脫絕耳故急補其真陽則陽能

生陰可以回絕續於無何有之鄉方中人參純是補氣之劑附子乃追亡逐失之妙藥相濟易於成功倘無參而徒用附子則陽旺而陰愈消故必用人參以爲君既用參矣而珍惜不肯多加終亦無效蓋陰精盡洩一身之中已爲空殼若不多加人參何以生津以長其再造之陰哉故必多加參而後收功耳○問用陰藥以引陽可否○天師曰似是而非此喻嘉言之臆說耳蓋陰精盡出用補陰之味內無根源何從補入故必補陽以生陰而不可補陰以引陽也論理陰精脫盡宜用瀝精之藥以閉之殊不知內已無陰何從閉瀝獨用人參補氣氣足而陰自生陰生而關自閉此不閉之閉正妙於閉也○至於夢遺脫精又不可執此法以治之夢遺

之病多成於讀書飄蕩之子或見色而思或亡洩而戰或用心作  
文以取快於一時或夜臥不安而漁色遂至風情大勝心氣不寧  
操守全無玉關不閉往往少年坐困老大徒傷爲可嘆也今立一  
方熟地八兩山茱萸四兩山藥八兩北五味三兩麥冬三兩炒棗  
仁四兩遠志一兩車前子三兩茯苓三兩芡實半觔白朮八兩各  
爲末蜜爲丸每日白滾水送下一兩一料全愈不再發此方妙在  
用芡實山藥爲君而以熟地山茱之類爲佐直補其心腎之陰而  
又以白朮利其腰膈而元精自不外洩況夢遺原無止法愈止而  
愈洩不若補其陰氣總或走泄亦不狼狽何必補澁而後不走失  
乎然則不閉之閉正深於閉又何必牡蠣金櫻子之爲得哉車前

利小便而不走氣利其水則必存其精又不可不知其功也

張公曰前後俱妙男女脫精以口送氣固佳然而不知其法以冷氣送之亦是徒然必須閉口先提關元之氣盡力嘯於口中而後送下喉可救於垂絕之頃否則適所以害之也但不可迷然離爐卽欲離爐亦須緩緩取出不可見其死去驚走下床也離爐抱住其身尚不至死此等症富貴人多而貧賤人少富貴人自宜獨參三兩或四兩或半斤或一觔愈妙煎湯灌之可以重甦若貧窮之士蒺布之婦亦得此病急用黃芪四兩當歸二兩附子二錢水五碗煎一碗急灌之亦有生者又不可不知卽死在床褥之內亦可以藥灌之而生大約夜死者日救之則活

以死者夜救之則亡夢遺之症余尚有一方至妙可佐 天師  
之不言有人夢遺日日而遺者有不須夢而遺者俱效改用芡  
實八兩山藥十兩生棗仁十兩蓮子心五錢將蓮子劈開肉不  
用單用其綠芽焙乾爲末前藥俱爲末米湯打粉爲丸如桐子  
大每日早晚用白滾水送下各五錢此方平淡之中有至理存  
焉蓋心一動而精卽遺此乃心虛之故而玉門不閉也方中山  
藥補腎而生精芡實生心而去濕生棗仁清心而益心包之火  
蓮肉心尤能清心而氣下通於腎使心腎相交關玉門之聖藥  
誰知蓮肉之妙全在心總由世醫之不讀書耳果然此段文乃  
載在大乘蓮花經內醫道所以須通竺典生棗仁正安其不睡



始能不泄妙在與山藥同用又能睡而不泄

華君曰同

雷公曰我亦有夢遺方最妙方用白朮八兩山藥八兩人參二兩  
生薑四兩遠志一兩麥冬四兩芡實四兩炒北五味一兩車  
前一兩各為末蜜為丸每日白滾水送下五錢自愈此亦補心  
腎之法

孫真君曰遇交感脫精惡以人參三兩煎湯灌之固是奇妙方  
法然貧家何以救之我有法人抱起坐之以人之口氣呵其  
口又恐不能入喉以筆管通其兩頭人病人喉內使女子呵之  
不必皆妻妾也凡婦人皆可盡力呵之雖死去者亦能生妙法

也吾今日洩天地之奇

石室金鑑

卷之十五

宋

藏板

# 吐治法

論痰塊壅塞

天師曰吐治者病在胃口之間不能下則必上越而吐之如人上焦壅滯痰塊不上不下塞在胸間氣喘欲嘔不能欲吐不肯者是也法當用陰陽水探吐之或用瓜蒂藜蘆煎汁飲之即吐然必痰氣與火結住在胸間作痛者始可用此法吐之否則斷斷不可蓋人之元氣不可一傷吐一次則五藏反覆必損壽元故必問其入胸痛否氣塞否喉間有所碍者痰吐出黃否有此數種始可用前藥以吐之苟或不盡然即病人自家欲吐亦須慎之无行醫者乎此吐治之一法在人裁度而用之耳

張公曰吐不可輕用不知禁忌而妄吐之必致五藏反覆不寧

天師之叮嚀告誡真仁人之言也。汝當敬聽我。更有一法教人宜吐之症。必須看其痰吐在壁上有光亮者。放心吐之。餘則皆忌光亮者。如蝸牛之涎一樣光亮也。但看見光亮者。無論其痰在上中下。此光亮之色必須俟其痰蹟乾而分辨之。不可據其濕痰時而卽以爲光亮也。

華君曰同

泄治法

天師曰泄治者汗之也邪居於腠理之間不肯自出必用汗藥以  
疏洩之方用荆芥一錢桔梗一錢防風一錢甘草一錢蘇葉一錢  
白朮五錢茯苓三錢陳皮五分水煎服此方妙在用白朮爲君而  
以表汁爲佐使蓋人之脾氣健而皮毛腠理始得開闢自如今用  
白朮以健土去濕而利腰膝邪已難於久住况有防風荆芥蘇葉  
之品盡散外邪何敢再居營衛又有甘草從中調治則邪不必攻  
而自散矣此泄治之佳者

張公曰予方泄治最多無如此方之妙我方一味主散 天師  
方妙在健脾而散邪也此方偏治冬月之泄汗或加入桂枝五

分乎武加入麻黃五分乎亦在人斟酌之耳

華君曰亦同

此治方用白朮與蘇合丸用白朮同意其法甚妙本于永謙